PHOTO

PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISE

Référents à contacter en cas d'urgence :

Téléphone parents : mère
père
Téléphone CHU
Téléphone MEDECIN TRAITANT
Téléphone Médecin de PMI :
Téléphone SAMU : 15
Téléphone pompiers : 18
Téléphone urgences (à partir d'un portable) : 112

NOM Prénom

Date de naissance

Objet du PAI : asthme / dérivation ventriculo-péritonéale

Trousse d'urgence : Classe de Mme/ Mx X : sur l'étagère au-dessus du chevalet de peinture / coin regroupement

Protocole de soins d'urgence :

En cas de …	Signes d'appel	Conduite à tenir
NAUSEES (possibilité que la valve soit bouchée)	Maux de tête, nausées, vomissements. Somnolence ; modification inhabituelle du comportement	**Contacter les parents.** **Contacter le SAMU si besoin.**
BRONCHITE / RHUME / TOUX ISOLEE	Toux répétée	**L'enfant doit être assis.** Agiter l'aérosol et libérer une dose de médicament dans l'aérosol. Maintenir l'appareil en position horizontale. 2 bouffées de suite de VENTOLINE au babyhaler.
CRISE D'ASTHME PERSISTANCE DES SYMPTOMES AUCUNE AMELIORATION	Respiration difficile Impression d'étouffer Sifflements respiratoires audibles Pâleur Angoisse / agitation de l'enfant	6 bouffées de suite de VENTOLINE au babyhaler (toutes les 10 minutes). Alerter les parents Alerter le SAMU

Intervention d'un ergothérapeute le jeudi matin à partir de 10h à l'école, sur le temps scolaire.
Coordonnées ergothérapeute :06 00 00 00 00